



# Estudio del carcinoma borderline de ovario en la comarca de Cartagena (2011-2014)

Spackova, A; Martínez Perez, B; Gómez Leal, P; Martínez García, JM; Buendía Alcaraz, A; Remezal Solano, M.  
HUSL Cartagena

**Objetivos:** Estudiar el conjunto de las pacientes con diagnosticadas de tumor ovárico borderline en el área de Salud II de la Región de Murcia entre los años 2011 a 2014.



**Material:** el conjunto de los nuevos diagnósticos de la malignidad ginecológica entre 2011 a 2014, que cifra en total 461 pacientes. En 52 casos se trataba de cáncer del ovario, lo cual supone una incidencia de 4,53 / 100 000 hab. / año.



**Resultados:** Se identifican 27 pacientes con tumor borderline de ovario como diagnóstico principal o bien como componente de lesiones malignas del ovario. También se incluyen 4 pacientes con tumoración benigna que en el análisis patológico intraoperatorio eran informadas como borderline, aunque el estudio definitivo desechó el diagnóstico. En 14 pacientes de esta serie carcinoma era el diagnóstico principal, si bien, la mayoría de ellas, ocho, presentaba estadio I. Se registró un exitus y dos recidivas en este grupo.

**Nueve Pacientes presentaban el tumor borderline como diagnóstico principal, una de ellas bilateral . Eso supone 17% del total de los cánceres de ovario y una incidencia de 3,13 por 100 000 hab. / año. En 5 casos se trataba de tumor borderline mucinoso y en 4 del tumor borderline seroso. La edad media de las pacientes era 45 y medían 41 años. El tratamiento de estas pacientes era quirúrgico, en 5 casos se realizó cirugía de estadiaje y en 3 anexectomía unilateral y en un caso bilateral. Las nueve pacientes están asintomáticas a fecha de hoy.**

**Método:** Se realiza estudio retrospectivo de todas las pacientes intervenidas por patología anexial en el hospital Sta Lucía de Cartagena y se selecciona un grupo de 27 pacientes en cuyas muestras histológicas se detectó un tumor borderline del ovario. Los tumores ováricos borderline o de baja malignidad se presentan preferentemente en mujeres premenopáusicas entre 30 a 50 años. Tienen muy buen pronóstico. Su tratamiento es principalmente quirúrgico. Con frecuencia acompaña a carcinomas epiteliales de bajo grado. La incidencia es de 1,5-2,5 casos en 100 000 hab. / año.



carcinoma

borderline

lesión benigna

## Conclusiones:

**En el Área II los tumores borderline como diagnóstico principal presentan una incidencia superior a la esperada, sobre todo a costa del tumor mucinoso borderline.**