

DISTRIBUCIÓN DE PATOLOGÍA VULVAR EN ÁREA III SEGÚN ANATOMÍA PATOLÓGICA DURANTE 2010-2014

Ángeles Yepes Carrillo, Karen L. Aguilar Duarte, Pablo López Ortín, M^a Remedios García

Andrés, Cristina López Vázquez, M^o Elvira García Ré, Julio Merino Montes*



Servicio de Ginecología y Obstetricia. HU Rafael Méndez. Lorca.

Objetivos: Analizar la distribución de patología vulvar, benigna, premaligna y maligna, en nuestro área según AP. Así como, distribución de patología neoplásica por edades y servicios procedentes.


Material y Métodos: Análisis retrospectivo de todas las anatomías de vulva recibidas en el servicio de AP en el periodo comprendido entre 2010-2014. Objetivando su naturaleza, prevalencia por edad y servicio procedente.

Resultados: De las 138 biopsias recibidas en AP, 10 correspondían a patología neoplásica (7,24% del total), siendo el carcinoma escamoso celular el más frecuente. De ellas, 23 mostraron lesiones preneoplásicas (16,67%), del tipo VIN,... La gran mayoría, 105 fueron hallazgos benignos (76,08% del total).

La inmensa mayoría de las biopsias recibidas fueron mandadas por el servicio de Ginecología.



El grupo de edad mayoritario en el que se encontraron las lesiones malignas fue a partir de los 60 años.



Conclusión: En nuestro área el carcinoma de células escamosas es el más frecuente dentro de la patología neoplásica, encontrándose en población mayor de 60 años. Resultados similares a los hallados en la literatura disponible hasta la actualidad.

*Facultativo adjunto del Servicio de Anatomía Patológica.