



VALORACIÓN DE PATOLOGÍA URETERAL POR ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL

Pérez Rocamora F*, Juan Pérez A**, Jiménez Machuca P*, Cañizares MF*, Llanos Llanos MC**, García Re E**.

Servicio Obstetricia y Ginecología, Hospital Rafael Méndez*, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca**.

INTRODUCCIÓN

En diversas enfermedades ginecológicas como la endometriosis o las neoplasias malignas se pueden ver afectados los uréteres a nivel pélvico. Estas estructuras se visualizan por ecografía con una morfología tubular fina, econegetiva, de pared gruesa ecogénica.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de dos pacientes en seguimiento en consultas de ginecología por endometriosis profunda, ambas refieren persistencia de moles=as abdominales que localizan en zona lumbar. En la ecogra?a vía transvaginal de control se realiza una valoración de los uréteres observando, en tercio inferior de uréter izquierdo, una imagen redondeada hiperrefringente, con sombra acús=ca, compa=ble con li=asis ureteral.



CONCLUSIONES

- Ø La visualización de la vejiga y los uréteres distales al realizar una ecogra?a pélvica de ru=na resulta de u=ilidad en la valoración del dolor pélvico, pudiendo encontrar cálculos ureterales con una incidencia del 0,1% en mujeres en las que se sospechaba dolor de causa ginecológica.
- Ø La afectación del tracto urinario ocurre en aproximadamente el 1-2% de las pacientes con endometriosis, afectando a la vejiga en el 85% de estos casos y a los uréteres en el 4% de las pacientes con endometriosis a nivel recto-vaginal.
- Ø En las pacientes con patología ginecológica candidatas a cirugía, la descripción de la afectación ureteral, incluido el si=o de obstrucción y la presencia de hidrouréter o hidronefrosis, facilita la evaluación preoperatoria de la función renal y mejora el asesoramiento preoperatorio.

